



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
เรื่อง การรณรงค์ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู

ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันโรคที่มีหนูเป็นพาหะ และมีส่วนร่วมในการดำเนินการกำจัดหนู พร้อมกันทั้งตำบลปากน้ำหลังสวน โดยมีกิจกรรมดังนี้

๑. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำแต่ละหมู่ ลงพื้นที่รับผิดชอบแจกเหยื่อพิษกำจัดหนู พร้อมแจกใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู

๒. ให้ประชาชนในตำบลปากน้ำหลังสวนวางเหยื่อพิษพร้อมกันในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. (หนึ่งทุ่ม)

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกครัวเรือน ได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการรณรงค์ตามโครงการดังกล่าว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

ลunya ระวัง โรคไข้ฉี่หนู

Leptospirosis

โรคไข้ฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
ที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่เป็นพาหะที่มีการติดเชื้อ
และปล่อยเชื้อออกมาทั้งปัสสาวะ และแฝงอยู่ในจุดที่
น้ำท่วมขังตามดิน โคลน แอ่งน้ำ หรือ น้ำผัก โดยเชื้อ
สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังตามรอยแผล รอยขีดข่วน
หรือเยื่อของปาก ตา จมูก

ระยะฟักตัวของเชื้อโรค
โดยเฉลี่ยประมาณ 10 วัน
หรืออยู่ในช่วง 4-19 วัน

พาหะหลัก คือ หนู
หรือสัตว์ฟันแทะ

พาหะรอง คือ หมา วัว และ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อื่นๆ

อาการผู้ป่วยโรคไข้ฉี่หนู

- ✓ ไข้สูงฉับพลัน ปวดศีรษะ
- ✓ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณน่อง โคนขา หรือปวดหลัง
- ✓ มีจุดเลือดออกตามผิวหนัง
- ✓ ต้วเหลือง ตาเหลือง ชี้น สับสน
- ✓ ไ้มีเลือดปน

วิธีป้องกัน



สวมรองเท้าบูทยาง
เพื่อป้องกันไม่ให้
บาดแผลสัมผัสน้ำ



หลีกเลี่ยงการลุยน้ำ
ลุยโคลน



รีบล้างเท้าหรืออาบน้ำ
ทำความสะอาดร่างกาย
โดยเร็ว



กำหนดการ

โครงการกำจัดสัตว์พาหะนำโรคในชุมชน (กำจัดหนู)

จัดกิจกรรมในวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567 ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ของทุกวัน	เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เรื่อง การรณรงค์กำจัดสัตว์พาหะนำโรค (กำจัดหนู)
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. เวลา 19.00 น.	อสม. ลงพื้นที่ครัวเรือนที่รับผิดชอบ - แจกใบปลิวให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคเลปโตสไปโรซิส หรือโรคฉี่หนู - แจกเหยื่อพิษกำจัดหนู ** ดำเนินการวางเหยื่อพิษกำจัดหนู ** พร้อมกันทั้งตำบลปากน้ำหลังสวน

เหยื่อพิษกำจัดหนู



- วิธีใช้ - วางเหยื่อพิษกำจัดหนู (2-3 ชิ้น) ลงในภาชนะรองรับ
- วางไว้ในพื้นที่มืดชิด หรือบริเวณที่มีหนูชุกชุม
- วางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร



ด้วยความห่วงใย

จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน